

Arboretum 't Laantje

Aan Het Laantje, een zijweg van de Ressensestraat in Ressen, ligt de ingang van een bomentuin: Arboretum 't Laantje. Op dit driehoekige perceel van de gemeente Lingewaard zijn vanaf 2021 in totaal 15 bijzondere bomen aangeplant. Het Arboretum is geschonken door Ans Wolters ter nagedachtenis aan haar man. De gemeente Lingewaard heeft gezorgd voor het ontwerp, de aanleg en de inrichting van de bomentuin. Stichting Boomrijk Lingewaard verzorgde namens Ans Wolters de begeleiding. Het Informatiebord is door Stichting Boomrijk Lingewaard ontworpen en geplaatst, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Natuur & Milieu Gelderland. Het arboretum wordt onderhouden door Ressense vrijwilligers, samen met Park Lingezegen. De opening van Arboretum 't Laantje was op 23 mei 2025.

De volgende bomen treft u aan het arboretum:

1. Pinus Nigra | Zwarte den

De zwarte den dankt zijn naam aan de zwarte, diep gegroefde schors. De naalden staan in bundels van twee bijeen en zijn opvallend donkergroen. De bijna symmetrische kegels zijn lichtbruin en hangen gewoonlijk in paren of alleen. Lege kegels vallen in het voorjaar af.



2. Populus simonii | Chinese balsempopulier

De Chinese balsempopulier komt van nature voor in de koele en gematigde gebieden van Mongolië en China. Het omgekeerde eivormige blad is donkergroen en heeft een grijsgroene tot grijswitte onderzijde. De herfstkleur is geelgroen tot groen. De jonge bast is grijsgroen en bij ouder worden wordt de schors gegroefd en donkergrijs. De boom is tweehuizig met vrouwelijke en mannelijke katjes



3. *Davidia involucrata* | Zakdoekjesboom

De Vaantjesboom of Zakdoekjesboom is een loofboom, bekend om zijn bloeiwijze, waarbij de twee grote schutbladen aan zakdoekjes doen denken. De stam bladdert in verschillende grijstinten af. Het blad is hartvormig tot eirond en grof gezaagd. De nootvormige vruchten zijn lang gesteeld en hangen alleen.



4. *Fagus orientalis* 'Iskander' | Oosterse beuk

De Oosterse beuk heeft een slanke opgaande groeiwijze. Het grote blad is ovaal tot omgekeerd eirond en glanzend donkergroen. Onopvallende bloei in mei met geelgroene bloemen. Pas op latere leeftijd krijgt de boom bruine vruchten.



5. *Quercus imbricaria* | Dakpaneik, lauriereik

De dakpaneik heeft zijn naam te danken aan de eerste Amerikaanse kolonisten die van het hout dakpannen maakten. Het blad is langwerpig-ovaal en doet denken aan laurierblad. In mei is de boom versierd met goudgele katjes als bloemen, van waaruit de kleine eikeltjes gevormd worden.



6. *Tilia mongolica* | Mongoolse linde

De Mongoolse lindeboom staat bekend om zijn mooie groei en bloei. De bladeren zijn sierlijk ingesneden, vergelijkbaar met het blad van een druivenrank. Het glanzende loof ontluikt rood, verkleurt daarna naar groen, om uiteindelijk diepgeel te worden in de herfst. In de maanden juni/juli heeft de lindeboom bleekgele, geurende bloemen.



7. *Aesculus flava* 'Vestita' | Paardenkastanje

De Amerikaanse paardenkastanje heeft handvormige bladeren die meestal uit 5 tot 7 blaadjes zijn opgebouwd. Het donkergroene blad is aan de onderkant licht behaard. In de herfst kleurt het blad bruingeel. De lichtgele bloemen bloeien in korte pluimen.



8. *Ulmus minor* 'Cloud corky' | Kurkiep

De Kurkiep heeft bruine twijgen met opvallende kurklijsten. Ook de bruingrijze oude bast is diep blokvormig gegroefd met kurkafzetting. Het blad is ovaal-langwerpig tot omgekeerd eirond. Het volwassen blad is onbehaard en glanzend groen. In maart bloeit de boom met kleine groen purperen bloemen.



9. *Castanea sativa* | Tamme kastanje

De Tamme kastanje heeft een donkergrijze stam die tordeert waardoor diepe groeven in de schors meedraaien. Het langwerpige blad is donkergroen en glimmend en heeft een duidelijk getande bladrand. De boom heeft witte en geurende mannelijke bloemen en minder opvallende groene vrouwelijke bloemen. De vruchten zijn eetbaar.



10. *Juglans nigra* | Zwarte walnoot

De Zwarte walnoot heeft een donkere stam met diepe groeven. De heldergroene geveerde bladeren kunnen wel 60 cm lang worden. Gewreven blad verspreidt een aangename geur. De boom krijgt na de bladontwikkeling hangende groene, mannelijke katjes en kleinere vrouwelijke bloemen. De kogelronde vruchten hebben een zwartbruine schaal en een smakelijke kern.



11. *Styphnolobium japonicum* | Honingboom

De Honingboom heeft een grijsbruine, gegroefde schors. Het samengestelde donkergroene blad is oneven geveerd en ca. 25 cm lang. De boom krijgt pas na 10 tot 15 jaar roomwitte tot roomgele bloemen. Vanwege de vele nectar is de boom een prima drachtboom voor bijen. De grijze peulen zijn tussen de zaden ingesnoerd en verschijnen in de herfst.



12. *Ostrya carpinifolia* | Europese hopbeuk

De Europese hopbeuk is een boom uit de berkenfamilie, dus geen familie van de beuk. De korte stam is bruingrijs, gegroefd en in smalle kleine plaatsjes loslatend. Het eironde tot ovale blad heeft een dubbel gezaagde bladrand en verkleurt in de herfst geel. In april verschijnen geelgroene, mannelijke katjes en onopvallende vrouwelijke bloemen in kleine aartjes. Deze groeien uit tot ca. 6 cm lange vruchten die de vorm hebben van hopbellen.




13. *Betula nigra* | Zwarte berk

De Zwarte berk is een sierlijke meerstammige boom met afhangende takken. De stam is op jonge leeftijd geelbruin, maar bladdert snel af en verkleurt later naar bruinrood tot zwart. Het dubbel gezaagde blad is glanzend diepgroen. Bij bloei in april krijgt de boom ca. 8 cm lange geelgroene katjes.



14. *Alnus glutinosa* 'Laciniata' | Zwarte els

De Zwarte els is een middelhoge boom. Het verspreid staande blad is diep ingesneden. Vrouwelijke bloemen zijn onopvallend, mannelijke bloemen zijn bruingele katjes. De elzenproppen verschijnen vanaf september en blijven lang aan de boom. Naast sierlijk blad heeft de boom ook een mooie groeiwijze met iets afhangende twijgen.



15. *Pterocarya fraxinifolia* | Vleugelnoot

De Gewone of Kaukasische vleugelnoot is een boom met lage vertakking en breed uitgroeiende zijtakken. Oude stammen zijn donkergrijs en diep netvormig gegroefd. De bladeren zijn geveerd, frisgroen en 30 tot 60 cm lang. De hangende vruchtkatjes blijven in de winter aan de boom hangen. De nootjes zijn onderling voorzien van 2 halfronde vleugels.

